


医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

HMG-CoA 還元酵素阻害剤  
ロスバスタチンカルシウム錠

### ロスバスタチン錠 2.5mg「フェルゼン」 ロスバスタチン錠 5mg「フェルゼン」

2022年8月



拝啓 時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、「使用上の注意」を改訂しましたので、今後のご使用に際しましては下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

#### <改訂内容> \_\_\_\_\_ : 自主改訂による変更箇所（追記）

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 現行の通り (1) 併用禁忌（併用しないこと） 現行の通り (2) 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 省略 (1) 併用禁忌（併用しないこと） 省略 (2) 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
バダデュスタット	現行の通り	現行の通り	バダデュスタット	省略	省略
フェブキシスタット	ロスバスタチンとフェブキシスタットを併用したとき、ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、Cmaxが約2.1倍上昇したとの報告がある。	フェブキシスタットがBCRPの機能を阻害することにより、本剤の血中濃度が増加する可能性がある。	エルトロンボパグ	省略	省略
エルトロンボパグ	現行の通り	現行の通り			

#### 【改訂理由】

先発医薬品のCCDS（Company Core Data Sheet:企業中核データシート）変更のため、併用注意を自主改訂いたしました。

以上

これらの情報は、2022年9月に発行予定のDSU No.311に掲載致します。

なお、改訂後の添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社ホームページ(<https://www.feldsenpharma.co.jp>)に掲載致しますので、併せてご参照下さい。