

販売元  販売元  
株式会社フェルゼンファーマ  
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

製造販売元  株式会社 **ビオメディクス**

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

免疫抑制剤

**シクロスポリンカプセル 10mg「BMD」**  
**シクロスポリンカプセル 25mg「BMD」**  
**シクロスポリンカプセル 50mg「BMD」**  
 (シクロスポリン製剤)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。この度、「使用上の注意」を自主改訂(2020年2月)致しますので、お知らせ申し上げます(一部:追記箇所)。

今後のご使用に関しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

また、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまますので、この点ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

改訂後(下線を追記)			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ドセタキセル パクリタキセル	本剤又はこれらの薬剤の血中濃度が上昇する可能性があるため、併用する場合には血中濃度を参考に投与量を調節すること。	代謝酵素を競合することにより、本剤又はこれらの薬剤の代謝が阻害される可能性がある。	ドセタキセル パクリタキセル	本剤又はこれらの薬剤の血中濃度が上昇する可能性があるため、併用する場合には血中濃度を参考に投与量を調節すること。	代謝酵素を競合することにより、本剤又はこれらの薬剤の代謝が阻害される可能性がある。
レテルモビル		レテルモビルのCYP3A阻害により本剤の血中濃度が上昇する可能性がある。また、本剤の有機アニオントランスポーター阻害によりレテルモビルの血中濃度が上昇する可能性がある。	エゼチミブ		機序は不明である。
エゼチミブ		機序は不明である。			

DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No.287(2020年3月) 掲載予定

### ＜お問い合わせ＞

お問い合わせは、株式会社フェルゼンファーマ安全管理部までご連絡ください。

TEL 03-6368-5160 FAX 03-3580-1522

以上